

鎮咳祛痰劑



作用 良好的鎮咳祛痰劑必須具備的條件是：效果確實、不傷腸胃以及副作用達最低程度。所含的成分以及作用如下：

成分	作用
Chlorpheniramine Maleate	是抗組織胺劑，可以緩解因為慢性過敏性鼻炎、竇炎或是併發於急性感冒引起的流鼻涕或過敏症狀
dl-Methylephedrine HCl	交感神經興奮劑，直接作用在中樞神經系統，可以使支氣管的平滑肌鬆弛，以緩解支氣管痙攣症狀，並可以緩解鼻黏膜充血引起的鼻炎、竇炎症狀（例如：鼻塞）
Platycodon Fluid Extract (桔梗萃取物)	具有鎮咳、祛痰的作用
Potassium Guaiacolsulfonate	可以增加支氣管的分泌，讓痰液變得比較稀、更容易被咳出
Thiamine Mononitrate (維生素 B1)	補充體力
Magnesium Trisilicate	遇到胃酸後，可以形成保護胃腸黏膜的膠狀物質，避免其他藥物引起胃腸刺激
Borneol (龍腦)	使味道清涼、芳香
Glycyrrhizae Radix Pulverata (甘草)	使味道甘甜

成分 每1.2 g含有
有效成分及含量
Chlorpheniramine Maleate 3 mg
dl-Methylephedrine HCl 25 mg
Platycodon Fluid Extract 30 mg
Potassium Guaiacolsulfonate 100 mg
Thiamine Mononitrate 5 mg

其他成分(賦形劑)

Sodium Saccharin、Caramel、Sucrose、Magnesium Trisilicate、Colloidal Silicon Dioxide、Corn Starch、Glycyrrhizae Radix Pulverata、Borneol

用途 (適應症) 緩解感冒之各種症狀(流鼻涕、鼻塞、打噴嚏、咳嗽、咳痰)

- 使用上注意事項**
- 有下列情形者，請勿使用：曾因本藥成分引起過敏的人。
 - 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：(a) 6歲以下 (b) 有肝、腎疾病或其他重大疾病的人 (c) 吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾病（如慢性氣管炎或肺氣腫）所引起之持續或慢性咳嗽的人 (d) 有呼吸疾病的人：如慢性支氣管炎、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難、及青光眼的人，因前列腺肥大引起排尿困難的人 (e) 有心臟病及65歲以上的人
 - 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：(a) 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦 (b) 正在服用其他綜合感冒、止咳化痰、鼻炎、抗過敏、止痛或退燒等藥品 (c) 服用鎮靜藥或安眠藥的人
 - 其他使用上注意事項：(a) 為防止兒童誤食請妥善保管 (b) 避免陽光直射 (c) 勿超過建議使用量 (d) 不要服用本藥超過七日 (e) 可能引起嗜睡，勿駕車或操作危險性機械 (f) 不得與酒精性飲料併用

用法用量	年齡	用量	用法
	成人	1次1.2g (1包或1匙)	通常一日3次服用
	8歲以上未滿15歲	1次0.6g (1/2包或1/2匙)	
	5歲以上未滿8歲	1次0.4g (1/3包或1/3匙)	

註：1.2 g 約 1 平匙

- 警語**
- 服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	發疹、發紅
消化器官	噁心、嘔吐、食欲不振
神經系統	頭暈、耳鳴
其他	喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊

- 服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：(a) 若有任何不適情形產生 (b) 咳嗽持續達一星期以上，或有高燒、膿痰、疹子或持續性頭痛 (c) 症狀沒有改善、或症狀還併隨有發燒、或發燒持續三日 (d) 喉嚨疼痛持續兩日以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐

包裝 6-800 包鋁箔袋盒裝 (每包 1.2 公克) / 7.2-1000 公克鋁箔-塑膠瓶、紙袋裝

醫師藥師藥劑生指示藥品 | 內衛藥製字第001005號 | 電腦代號 DPA00 | 註冊商標

國際標準 GIC/S.G.M.P. 合格藥廠
回春堂製藥股份有限公司

總公司：桃園市桃園區新華路133號

DIPA001_02