

小兒綜合感冒藥



- 成分** 每g中含有
- 有效成分及含量
- Acetaminophen 100 mg
- Chlorpheniramine Maleate 0.83 mg
- Dextromethorphan Hydrobromide 5.33 mg
- dl-Methylephedrine HCl..... 6.70 mg
- 其他成分(賦形劑)
- Sucrose、Colloidal Silicon Dioxide、Sodium Saccharin、Citric Acid、Sunset Yellow FCF、Orange Flavor、Corn Starch、HPMC

用途 (適應症) 緩解感冒之各種症狀
(咽喉痛、畏寒、發燒、頭痛、關節痛、肌肉酸痛、流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咳嗽、咯痰)

- 使用上注意事項**
- 有下列情形者，請勿使用：(a) 曾因本藥成分引起過敏的人 (b) 服用單胺氧化酶抑制劑 (MAOI) 或血清素回收抑制劑型的抗憂鬱劑 (SSRI) 的人
 - 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：(a) 6歲以下 (b) 有肝、腎疾病或其他重大疾病的人 (c) 吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾病 (如慢性氣管炎或肺氣腫) 所引起之持續或慢性咳嗽的人 (d) 有呼吸疾病的人：如慢性支氣管炎、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難，及青光眼的人、因前列腺肥大引起排尿困難的人 (e) 有心臟病及65歲以上的人
 - 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥劑生：(a) 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦 (b) 正在服用其他綜合感冒、止咳化痰、鼻炎、抗過敏、止痛或退燒等藥品 (c) 同時服用含Acetaminophen成分之止痛、退燒或綜合感冒等藥品 (d) 服用鎮靜藥或安眠藥的人
 - 其他使用上注意事項：(a) 為防止兒童誤食請妥善保管 (b) 避免陽光直射 (c) 勿超過建議使用量 (d) 不要服用本藥超過七日 (e) 服用過量的 Acetaminophen可能是因為想要更快或更強的止痛效果，或是在不知道及未注意的情況下重複服用含Acetaminophen成分的藥品，但是每天服用Acetaminophen超過4,000毫克 (mg) 會發生肝臟損害 (f) 酒精警語：不得併服含酒精飲料，因為 Acetaminophen (Paracetamol) 有急性肝衰竭的風險 (g) 可能引起嗜睡，勿駕車或操作危險性機械 (h) 不得與酒精性飲料併用

用法用量

年齡	用量	用法
9歲以上未滿12歲	1次1g (1包)	一日4次
6歲以上未滿9歲	1次2/3g (2/3包)	
未滿6歲	請洽醫師診治	

- 警語** 1. 服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	發疹、發紅
消化器官	噁心、嘔吐、食欲不振
神經系統	頭暈、耳鳴
其他	喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊

- 服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：(a) 若有任何不適情況產生 (b) 咳嗽持續達一星期以上，或有高燒、膿痰、疹子或持續性頭痛 (c) 症狀沒有改善、或症狀還併隨有發燒、或發燒持續三日 (d) 喉嚨疼痛持續兩日以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐 (e) 服用過量 [每日超過Acetaminophen 4,000毫克 (mg)]，或服藥後出現下列症狀：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、蒼白及出汗等 (f) 有過敏情形：例如：臉、口及喉嚨腫脹、呼吸困難、蕁麻疹、皮疹或其它皮膚過敏、搔癢以及嘔吐

包裝 8~1000公克塑膠瓶裝，8~1000包鋁箔袋盒裝 (每包1公克)

儲存條件 儲存於25°C以下乾燥處

醫師藥劑生指示藥品 | 衛署藥製字第032244號 | 電腦代號 DGA02 | © 註冊商標

國際標準 PIC/S GMP 合格藥廠

回春堂製藥廠股份有限公司

台灣·桃園廠 桃園市新屋區中興路988號

DIGA020_03