

# 痔瘡治療劑

**B** 千痔康<sup>®</sup> 栓劑  
Anti-Gi Suppository

千痔康栓劑由消炎、止痛、止癢、止血、殺菌等多種成分配合而成，確保全部主成分在局部發揮作用，減少藥物系統反應之副作用，安全性高，直接作用於患部能立即消除及有效減輕患者不舒服的症狀，幫助患者維持正常活動。本品並含 Bismuth Subnitrate 能覆蓋受損傷口形成保護膜，避免二度感染

- 本品特點：
- 確保全部主成分在局部發揮作用
  - 潔密包栓劑，方便攜帶
  - 減少藥物系統性反應之副作用，安全性高
  - 迅速溶解，發生作用
  - 直接作用於患部，能立即消除及有效減輕患者不舒服的症狀，幫助患者維持正常活動

## 成分 每粒中(1.8g)含有

### 有效成分及含量

Benzocaine .....	50 mg
Bismuth Subnitrate .....	100 mg
Chlorhexidine Acetate .....	5 mg
Enoxolone (Glycyrrhetic Acid) .....	20 mg
Lidocaine .....	4.0 mg
Phenylephrine HCl .....	2.4 mg

其他成分(賦形劑)

Glycerides, Fatty Acids Mixtures

## 用途(適應症)

內痔、外痔、痔出血、肛門裂傷、肛門周圍炎

## 使用上注意事項

1. 有下列情形者，請勿使用：(a)對本藥成分過敏的人(b)2歲以下
2. 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：(a)孕婦、可能懷孕婦女(b)超過2歲未滿12歲(c)排尿困難及曾診斷為青光眼的人(d)服用抗憂鬱劑及曾診斷為下列疾病的人：高血壓、心臟病、糖尿病、甲狀腺肥大引起排尿困難
3. 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥劑師：(a)正在接受醫生治療痔瘡的人(b)哺乳婦(c)如果使用本藥7天後仍需繼續使用
4. 其他使用上注意事項：(a)為防止兒童誤食請妥善保管(b)避免陽光直射(c)勿超過建議使用量或使用次數(d)使用前，請以中性肥皂和溫水清潔患部，並以衛生紙或柔軟毛巾輕拍到乾(e)請注意不要誤入眼睛，萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立即前往眼科就醫(f)本藥限於肛門外部或直腸末端內使用，不得內服(g)請依照建議劑量使用，不可過量(h)不得連續使用一週以上

## 用法用量

年齡	用量	用法
成人	1次1粒	一日1~2回；使用時將包裝內容物取出迅速塞入肛門內；若因氣候或其他外界因素，使內容物軟化時，請於使用前置入冰箱內，待之固化後即可取出使用

## 警語

1. 使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥劑師：

身體部位	副作用
神經系統	間歇性痙攣、昏迷、精神錯亂、運動神經障害
其他	不舒服感、記憶力減退、頭痛、四肢無力、注意力減低、虛弱、嗜睡、倦怠、過敏現象

2. 使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫生診治：  
(a)若有持續出血情況 (b)若有上述外之不適當產生 (c)使用7天後，自覺狀況沒有改善或更惡化 (d)休克(過敏反應)，使用後立即產生如皮膚癢、聲音嘶啞、打噴嚏、喉嚨搔癢、呼吸困難、心悸、意識不清等 (e)本藥含Benzocaine，可能造成罕見但嚴重的變性血紅素症(Methemoglobinemia)之不良反應，若在用藥後(通常2小時內)發生虛弱、神經混亂、頭痛、呼吸困難，或皮膚顏色呈現蒼白灰色或藍色 (f)經數次使用後病況未見好轉時

## 包裝

4~100粒PVC潔密包裝袋

## 儲存條件

請在原包裝內，保存於30°C以下。若內容物軟化，請於使用前置入冰箱，固化後即可取出使用

醫師藥劑師指示藥品 | 衛署藥製字第012407號 | 電腦代號DUN01 | © 註冊商標

國際標準 PIC/S GMP 合格藥廠

回春堂製藥廠股份有限公司

台灣·桃園廠 桃園市新屋區中興路988號

DIUN010\_03