

敵敏克必顆粒含有新型抗組織胺劑Brompheniramine Maleate及緩解呼吸道黏膜腫脹之Pseudoephedrine HCl能有效治療因感冒或季節氣候變化，常年性過敏所引起之鼻塞、流鼻水、過敏性鼻炎等上呼吸道過敏症狀迅速緩解，清淨鼻腔、暢通呼吸、藥效確實。本品芳香可口，容易吞服吸收快

成分 每g中含有

有效成分及含量

Brompheniramine Maleate..... 4 mg

Pseudoephedrine HCl..... 15 mg

其他成分(賦形劑)

Sucrose、Corn Starch、New Coccine、Sucralose、Strawberry Oil、Silicon Dioxide Colloidal

用途(適應症) 緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀(鼻塞、流鼻水、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢)

使用上注意事項

- 有下列情形者，請勿使用：(a)曾因本藥成分引起過敏的人(b)服用單胺氧化酶抑制劑(MAOI)的人，或停用MAOI兩星期內，不得服用本藥，如不了解服用的藥品是否含有MAOI，請詢問醫師或藥師
- 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：(a)3歲以下(b)嚴重代謝性肝腎疾病的人
(c)曾診斷為下列疾病的人：心臟病、高血壓、糖尿病、甲狀腺機能亢進、因前列腺肥大引起排尿困難
(d)有呼吸疾病的人：如慢性支氣管炎、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難，及青光眼的人
- 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：(a)孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦(b)65歲以上
(c)服用鎮靜藥或安眠藥的人(d)服用其他綜合感冒藥、鎮咳祛痰藥、鎮痛藥、鼻立藥或抗過敏藥等的人
- 其他使用上注意事項：(a)為防止兒童誤食請妥善保管(b)避免陽光直射(c)勿超過建議使用量
(d)不得與酒精性飲料併用(e)可能引起嗜睡，勿駕車或操作危險性機械

用法用量

年齡	用量	用法
成人及12歲以上	1次1g (1包)	一日4次， 每次間隔4小時以上服用
6歲以上未滿12歲	1次0.5g (1/2包)	
3歲以上未滿6歲	1次0.25g (1/4包)	
3歲以下之嬰幼兒	請洽醫師診治不宜自行使用	

醫語 1. 服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
神經系統	倦怠感、興奮
其他	口乾、視覺上之困擾

2. 服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
(a)若有任何不適情況產生(b)連續服用本藥數日後，症狀沒有改善

包裝 8-1000公克塑膠瓶裝，8-1000包鋁箔袋裝(每包1公克)