

(腸溶)緩下劑



成分 每錠中含有

有效成分及含量

Bisacodyl..... 2.5 mg

其他成分(賦形劑)

Calcium Phosphate Dibasic、Silicon Dioxide、Magnesium Stearate、Talc、Carboxymethylcellulose Sodium、Corn Starch、Sodium Starch Glycolate、Lactose、Sucrose、Microcrystalline Cellulose、Titanium Dioxide、Polyethylene Glycol 6000、Diethyl Phthalate、Methacrylic Acid Copolymer (Type A)、Methacrylic Acid Copolymer (Type B)

用途(適應症) 緩解便秘

使用上注意事項

1. 有下列情形者，請勿使用：(a)曾因本藥成分引起過敏的人(b)胃腸道阻塞、腹痛、嘔吐、噁心的人
2. 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：3歲以下
3. 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：(a)孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦(b)連續使用一星期以上(c)併用其他瀉劑
4. 其他使用上注意事項：(a)為防止兒童誤食請妥善保管(b)避免陽光直射(c)勿超過建議使用量(d)本藥不應長期使用，一旦排便正常，即應停藥。應儘量以含纖維飲食，充分攝取水分及運動來改善便秘(e)本藥使用期間可能會有腹瀉發生(f)長期使用會造成電解質不平衡與水份缺乏(g)須整粒吞服，不得咬碎或磨粉，且用藥前後一小時不得使用制酸劑或牛乳

用法用量

| 年齡 | 用量 | 用法 |
|-----------|--------------|--|
| 12歲以上及成人 | 1次2~6錠 | 一日1次，於睡前(或空腹時)服用 初次應使用最小劑量，再視通便 情況增減用量 |
| 6歲以上未滿12歲 | 1次1~3錠 | |
| 3歲以下之嬰幼兒 | 請洽醫師診治不宜自行使用 | |

警語

1. 使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

| 身體部位 | 副作用 |
|------|------------|
| 胃腸道 | 噁心、嘔吐、嚴重腹痛 |
| 其他 | 發疹等過敏症狀 |

2. 使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並接受醫師診治：
(a)有任何不適情況產生 (b)腹瀉持續不止或更嚴重 (c)有血便及自發性腸道出血狀況
(d)使用一星期後無效

包裝 2~1000 錠玻璃瓶裝、PTP鋁箔(潔密包)盒裝

醫師藥師藥劑生指示藥品 | 衛署藥製字第020008號 | 電腦代號 DFL00 | ©註冊商標

國際標準 **PIC/S GMP** 合格藥廠
回春堂製藥廠股份有限公司
台灣·桃園廠 桃園市新屋區中興路988號

DIFL000_04