

# 抗過敏劑



鼻敏佳含有抗組織胺劑 Carboxamine Maleate 及緩解呼吸道黏膜腫脹之 Pseudoephedrine HCl 能有效治療因感冒或季節氣候變化、長年性過敏所引起之鼻塞、流鼻水、過敏性鼻炎等上呼吸道過敏症狀，清淨鼻腔、暢通呼吸、藥效確實。並含有 Caffeine Anhydrous 能減低因感冒、鼻塞、流鼻水引起之倦怠。

## 成分

每膠囊中含有

### 有效成分及含量

Caffeine Anhydrous ..... 30 mg

Carboxamine Maleate ..... 4 mg

Pseudoephedrine HCl ..... 60 mg

### 其他成分(賦形劑)

Silicon Dioxide Colloidal、Talc、Magnesium Stearate、Corn Starch、  
Hard Capsule Shell (Gelatin、Glycerol、Sodium Lauryl Sulfate、New Coccin、  
Brilliant Blue FCF、Titanium Dioxide、Purified Water)

**用途 (適應症)** 緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀 (鼻塞、流鼻水、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢)

## 使用上注意事項

- 有下列情形者，請勿使用：(a) 曾因本藥成分引起過敏的人 (b) 服用單胺氧化酶抑制劑 (MAOI) 的人，或停用MAOI兩星期內，不得服用本藥，如不了解服用之藥物是否含有MAOI，請詢問醫師或藥師。
- 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：(a) 12歲以下 (b) 嚴重代謝性肝腎疾病的人 (c) 曾診斷為下列疾病的人：心臟病、高血壓、糖尿病、甲狀腺機能亢進、因前列腺肥大引起排尿困難 (d) 有呼吸疾病的人：如慢性支氣管炎、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難，及青光眼的人。
- 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：(a) 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦 (b) 65歲以上 (c) 服用鎮靜藥或安眠藥的人 (d) 服用其他綜合感冒藥、鎮咳祛痰藥、鎮暈藥、鼻炎藥或抗過敏藥等的人。
- 其他使用上注意事項：(a) 為防止兒童誤食請妥善保管 (b) 避免陽光直射 (c) 勿超過建議使用量 (d) 不得與酒精性飲料並用 (e) 可能引起嗜睡，勿駕車或操作危險性機械 (f) 避免再服用含咖啡因藥品、飲料，過多的咖啡因會引起神經緊張，興奮與失眠，且常會引起心搏過速。

## 用法用量

年齡	用量	用法
成人及12歲以上	1次1粒	1日3~4次，每次間隔4小時以上服用
12歲以下	請洽醫師診治	

## 警語

- 服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
神經系統	倦怠感、興奮
其他	口乾、視覺上之困擾

- 服用本藥後，若發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：  
(a)若有任何不適情況產生(b)連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善。

**儲存方式** 本品應存放於 30°C 以下乾燥處所

**包裝** 6-28粒PTP盒裝潔密包

醫師藥師藥劑生指示藥品 | 衛署藥製字第015452號 | 電腦代號 DCH50 | ® 註冊商標

國際標準 (PIC/S GMP) 合格藥廠  
**回春堂製藥廠股份有限公司**  
台灣・桃園廠 桃園市新屋區中興路988號

DICH500\_03