

# 綜合感冒藥



**成分** 每錠中含有  
有效成分及含量

Acetaminophen.....	500 mg
Brompheniramine Maleate .....	4 mg
Dextromethorphan HBr .....	10 mg
Pseudoephedrine HCl .....	60 mg

其他成分(賦形劑)

Microcrystalline Cellulose 101、Corn Starch、Talc、Magnesium Stearate、  
Food Yellow No.5、Sodium Starch Glycolate

**用途（適應症）** 緩解感冒之各種症狀  
(流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咽喉痛、咳嗽、畏寒、發燒、頭痛、關節痛、肌肉酸痛)

- 使用上注意事項** 1. 有下列情形者，請勿使用：(a) 曾因本藥成分引起過敏的人 (b) 服用單胺氧化酶抑制劑 (MAOI) 或血清素回收抑制劑型的抗憂鬱劑 (SSRI) 的人 (c) 服用單胺氧化酶抑制劑 (MAOI) 期間，或停用MAOI兩星期內。如不了解服用之藥物是否含有MAOI，請詢問醫師或藥師
2. 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：(a) 6歲以下 (b) 有肝、腎疾病或其他重大疾病的人 (c) 吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾病（如慢性氣管炎或肺氣腫）所引起之持續或慢性咳嗽的人 (d) 曾診斷為下列疾病的人：心臟病、高血壓、糖尿病、甲狀腺機能亢進、因前列腺肥大引起排尿困難 (e) 有呼吸疾病的人：如慢性支氣管炎、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難，及青光眼的人
3. 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：(a) 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦 (b) 正在服用其他綜合感冒、止咳化痰、鼻炎、抗過敏、止痛或退燒等藥品 (c) 同時服用含Acetaminophen成分之止痛、退燒或綜合感冒等藥品 (d) 服用鎮靜藥或安眠藥的人
4. 其他使用上注意事項：(a) 為防止兒童誤食請妥善保管 (b) 避免陽光直射 (c) 勿超過建議使用量 (d) 不要服用本藥超過七日 (e) 服用過量的Acetaminophen可能是因為想要更快或更強的止痛效果，或是在不知道及未注意的情況下重複服用含Acetaminophen成分的藥品，但是每天服用Acetaminophen超過4,000毫克 (mg) 會發生肝臟損害 (f) 酒精警語：不得併服含酒精飲料，因為Acetaminophen (Paracetamol) 有急性肝衰竭的風險 (g) 可能引起嗜睡，勿駕車或操作危險性機械

## 用法用量

年齡	用法	用量
成人及12歲以上	1次1錠	一日3~4次
6歲以上未滿12歲	1次1/2錠	
3歲以上未滿6歲	1次1/4錠	
3歲以下	請洽醫師診治	

**警語** 1. 服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	發疹、發紅
消化器官	噁心、嘔吐、食慾不振
神經系統	頭暈、耳鳴
其他	喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊

2. 服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：(a) 若有任何不適情況產生 (b) 咳嗽持續達一星期以上，或有高燒、膿痰、疹子或持續性頭痛 (c) 症狀沒有改善、或症狀還併隨有發燒、或發燒持續三日 (d) 喉嚨疼痛持續兩日以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐 (e) 服用過量 [每日超過Acetaminophen 4,000毫克 (mg)]，或服藥後出現下列症狀：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、蒼白及出汗等 (f) 有過敏情形：例如：臉、口及喉嚨腫脹、呼吸困難、蕁麻疹、皮疹或其它皮膚過敏、搔癢以及嘔吐

**包裝** 6~28粒潔密包盒裝、ALU-ALU鋁箔盒裝

醫師藥師藥劑生指示藥品 | 衛署藥製字第013001號 | 電腦代號 DTP13 | ® 註冊商標

國際標準 (PIC/S GMP) 合格藥廠  
**回春堂製藥廠股份有限公司**  
台灣・桃園廠 桃園市新屋區中興路988號

DITP130\_02