

鎮咳祛痰劑

回春堂®
止咳膠囊
CHISOU COUGH CAPSULES "HCT"

作用 本藥含有鎮咳、祛痰、支氣管舒張以及抗組織胺成分，用於緩解咳嗽症狀，一般而言，服用後 20 至 30 分鐘後，會產生止咳效果，可以持續 3 至 4 小時，並且不會產生習慣性以及便秘等副作用

成分 每膠囊中含有
有效成分及含量
Brompheniramine Maleate 2.5 mg
Cloperastine HCl 20 mg
dl-Methylephedrine HCl 16.6 mg
Potassium Guaiacolsulfonate 80 mg

其他成分(賦形劑)

Corn Starch、Magnesium Stearate、Sodium Starch Glycolate、French Chalk、
Hard Capsule Shell 1 (Gelatin、Glycerol、Sodium Lauryl Sulfate、New Coccin、Brilliant Blue FCF、Purified Water)
Hard Capsule Shell 2 (Gelatin、Sodium Lauryl Sulfate、New Coccin、Purified Water)

用途 (適應症) 緩解感冒之各種症狀(流鼻涕、鼻塞、打噴嚏、咳嗽、喀痰)

- 使用上注意事項**
1. 有下列情形者，請勿使用：曾因本藥成分引起過敏的人
 2. 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：(a) 6歲以下 (b) 有肝、腎疾病或其他重大疾病的人 (c) 吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾病(如慢性氣管炎或肺氣腫)所引起之持續或慢性咳嗽的人 (d) 有呼吸疾病的人：如慢性支氣管炎、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難、及青光眼的人、因前列腺肥大引起排尿困難的人 (e) 有心臟病及65歲以上的人
 3. 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：(a) 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦 (b) 正在服用其他綜合感冒、止咳化痰、鼻炎、抗過敏、止痛或退燒等藥品 (c) 服用鎮靜藥或安眠藥的人
 4. 其他使用上注意事項：(a) 為防止兒童誤食，請妥善保管 (b) 避免陽光直射 (c) 勿超過建議使用量 (d) 不得與酒精性飲料併用 (e) 不要服用本藥超過七日 (f) 可能引起嗜睡，勿駕車或操作危險性機械

用法用量 通常成人1次1粒，一日3次，飯後服用

警語 1. 服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	發疹、發紅
消化器官	噁心、嘔吐、食慾不振
神經系統	頭暈、耳鳴
其他	喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊

2. 服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
- (a) 若有任何不適情況產生
 - (b) 咳嗽持續達一星期以上，或有高燒、膿痰、疹子或持續性頭痛
 - (c) 症狀沒有改善、或症狀還併隨有發燒、或發燒持續三日
 - (d) 喉嚨疼痛持續兩日以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐

包裝 10~1000粒 塑膠瓶裝、PTP盒裝

醫師藥師藥劑生指示藥品 | 衛署藥製字第004739號 | 電腦代號 DCA00 | © 註冊商標

國際標準 (PIC/S GMP) 合格藥廠
回春堂製藥廠股份有限公司
台灣·桃園廠 桃園市新屋區中興路988號

DICA000_04