

# 氣喘治療劑

**喘悅 Antiasth<sup>®</sup>**  
長效錠持續型225公絲 Slow Release  
(胺非林 Aminophylline) Tablets 225mg

## 特點

1. 本品服用簡便，每日兩次，患者不必在工作、上課或閒暇活動中匆忙服藥
2. 24小時預防支氣管痙攣，喘悅長效錠服用後能持續不斷地釋出，維持適當治療濃度
3. 對擬交感神經作用劑無效的患者 (Sympathomimetic Resistant) 亦可發生作用，必要時可與 Sympathomimetic吸入劑併用而有增益治療之效
4. 無一般傳統性口服Aminophylline的不良副作用，傳統性Aminophylline藥效短且有刺激腸胃、噁心、腹瀉、不安、心悸等缺點


## 成分

每錠中含有  
有效成分及含量

Aminophylline ..... 225 mg

其他成分(賦形劑)

Calcium Phosphate、Methyl Cellulose 450、Magnesium Stearate



## 用途(適應症)

氣喘及支氣管痙攣

## 用法用量

成人：每日早晚各1次，每次一錠；必要時可增至每日2次，每次二錠；如為預防長夜引起之氣管痙攣，可於就寢前服用一錠，必要時亦可同時服用二錠

小兒：每日每公斤體重12~20mg，八歲以上的兒童1次可服半錠至一錠，患有慢性氣喘的兒童，需要較高劑量，可每日每公斤體重給予25~42mg之間的劑量  
(註：服用時應整錠吞服不可嚼碎)

## 臨床所見

氣喘 (Asthma) 之特徵為突發的呼吸困難和哮鳴、肺部過度膨脹、咳嗽和氣管囉音。其發生可能突發或潛隱，其持續時間有時很短，有時數週，症狀乃由於泛發性支氣管阻塞，如支氣管平滑肌緊縮、支氣管壁肥厚、支氣管粘膜水腫和分泌物積於支氣管腔的結果，有許許多多的因素會引起氣喘，包括過敏原、刺激物、運動、情緒變化以及感染等，適當的處理是：第一認清並去掉可能引起氣喘發作的因素，其次是給予病人足夠的水份和適當的藥品

## 作用機序

1. 喘悅長效錠是經由阻斷PDE酵素(Phosphodiesterase)，從而鬆弛支氣管平滑肌之痙攣

2. 抑制肥大細胞 (Mast Cell) 分泌出使支氣管痙攣的物質



## 副作用

因喘悅長效錠具有持續釋放的作用，使其沒有一般Aminophylline和其它Xanthine衍生物所引起的中樞神經系統(CNS)刺激、頭痛、腸胃刺激等副作用

## 禁忌症

喘悅長效錠迄今無禁忌的報告

## 包裝

2~1000錠 瓶裝、PTP潔密包盒裝

## 參考文獻

1. The Extra Pharmacopoeia
2. Physician's Desk Reference(1986)

本藥須由醫師處方使用 | 衛署藥製字第032286號 | 電腦代號 DTA10 | ©註冊商標

國際標準 **PIC/S GMP** 合格藥廠

**回春堂製藥廠股份有限公司**

台灣·桃園廠 桃園市新屋區中興路988號

DITA100\_03