



均隆驅風油®

KWAN LOONG MEDICATED OIL

此油無論大人小兒月婦如有患中風中痰者均可適用

藥品至繁病情不一通其性而怡其情固屬難事則配藥製方尤非易本號之驅風油為本主人久經研究試驗選藥監製而成此油對於下列各症均奏良效故自問世以來遠近求購者紛至沓來茲為利便人羣急需起見特設各埠代售惟是魚目混珠難防影射。

諸君光顧請認雙獅圖招牌為記庶不致誤僻處村落舟車旅行或往鑛山或入森林猝遇急症求醫非易攜有驅風油可保平安也。

—均隆號 謹啟

凡用均隆油搽患處時須先用熱水搽患處再用毛巾拭乾後方可用均隆油摩擦之搽後宜穿回絨衫足部宜蓋氈以蘊蓄其氣

成分 每100cc中含有

有效成分及含量

樟腦Camphor 10 g
薄荷腦Menthol 25 g

其他成分(賦形劑)

薰衣草油Lavender Oil 冬青油Methyl Salicylate
桉葉油Eucalyptus Oil 松節油Turpentine Oil
Liquid Para n

用途(適應症)

頭眩鼻塞 肚痛頭痛 小兒腹痛 胸膈不舒 蚊蟲咬傷
湯火灼傷 止癢消腫 手足痠痛 肌肉痠痛 暈車船

用法用量

用量	用法
一日數次	擦抹患處

使用上注意事項

1. 有下列情形者，請勿使用：(a)曾因本藥成分引起過敏的人 (b)2歲以下之兒童(c)曾經對阿斯匹靈或水楊酸有過敏或敏感現象的人
2. 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：有深部皮膚組織感染
3. 有下列情形者，使用前請洽醫師藥師藥劑生：兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦
4. 其他使用上注意事項：(a)防止兒童誤食請妥善保管(b)避免陽光直射超過建議使用量或使用次數(d)使用部位或其周圍請搽乾淨後再用藥(e)使用本藥前後應徹底洗淨雙手(f)請注意不要讓藥油入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立即就醫(g)使用後請保持塗抹部位透氣，密封，以免增加副作用(h)本藥限於外用不得內服，亦不得用於眼睛四周或黏膜(鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等)(i)Methyl Salicylate不可長期大面積使用，以免引起水楊酸中毒症狀，如呼吸困難過高、面色潮紅、持續性耳鳴、劇烈或持續痛楚請洽醫師或藥師(j)避免觸碰衣物、塑膠品、木材、金屬

警語

使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	紅斑、搔癢、刺痛感
其他	水楊酸效應(耳鳴、暈眩、噁心、嘔吐等)

使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

- (a)若有上述外之其他不適情況產生
- (b)使用7天後，自覺狀況沒有改善或更惡化

包裝

500毫升以下玻璃瓶裝、玻璃瓶裝(含滾珠)

乙類成藥 | 衛署成製字第007427號 | 電腦代號DLE04 | ® 註冊商標

國際標準 PIC/S GMP 合格藥廠

回春堂製藥廠股份有限公司

台灣·桃園廠 桃園市新屋區中興路988號

DILE041_03